



Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2020/2021

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren									
		6	2	3	4	5–10	11 [*]	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60	
			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1			J2			
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)																
Tetanus ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e			
Diphtherie ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A ^e			
Pertussis ^b		G1		G2		G3 ^c						A1		A2			A3 ^e			
Hib ^b <i>H. influenzae</i> Typ b		G1		G2		G3 ^c														
Poliomyelitis ^b		G1		G2		G3 ^c							A1							
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c														
Pneumokokken ^b		G1		G2		G3 ^c											S ^g			
Meningokokken C							G1													
Masern							G1								G2			S ^f		
Mumps, Röteln							G1								G2					
Varizellen							G1								G2					
HPV Humane Papillomviren													G1 ^d	G2 ^d						
Herpes zoster																			G1 ^h	G2 ^h
Influenza																			S (jährlich)	

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen
 G Grundimmunisierung
 (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
 A Auffrischimpfung
 S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
 - b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
 - c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate
 - d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich
 - e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
 - f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
 - g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
 - h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden